



---

## EXCLUSIÓN

- Hasta 5 días después de que haya comenzado el tratamiento con antibióticos.

## CAUSA

- La bacteria *Bordetella pertussis*

## SÍNTOMAS

- Comienzan 5-21 días después de la exposición a la bacteria *pertussis*
- Comienza con fluidos nasales estornudos, tos leve y tal vez un poco de fiebre
- Avanza a accesos incontrolables de tos que a menudo terminan en un sonido sibilante agudo y vómitos (los infantes de menos de seis meses de nacido, niños mayores y adultos podrían no presentar el sonido de la tos).
- La tos se prolonga y generalmente interfiere con el sueño
- Los infantes infectados y los pre-escolares tienen mayor riesgo de enfermedad grave

## PROPAGACIÓN

- El individuo infectado tose o estornuda y libera pequeñas gotas con la bacteria que son inhaladas por otros.
- La propagación entre miembros de un grupo familiar es algo frecuente
- Los adultos y jóvenes levemente enfermos pueden propagar la enfermedad a los infantes y niños.

## PERIODO CONTAGIOSO

- Comienza cuando los síntomas todavía son leves y la enfermedad podría no ser obvia. Las personas seguirán siendo contagiosas hasta por 3 semanas después que comience la tos si se tratan. Si se tratan, continúa hasta 5 d